

DuoCor.Lab

Ветеринарная лаборатория

ПРАЙС Ноябрь 2025

НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Позвонить по телефону +7 (812) 407-13-09
Связаться с менеджером: +7 (965) 795-43-16
Отправить запрос на почту:
info@duocor-lab.ru

АДРЕСА ЛАБОРАТОРИЙ

Санкт-Петербург, улица Львовская, 10
Всеволожск, Колтушское шоссе, 19/11
ЛО, г.п. Янино-1, улица Голландская, 23

РЕЖИМ РАБОТЫ

Круглосуточно

БОЛЬШЕ О ЛАБОРАТОРИИ

duocor-lab.ru

Клинические исследования

Гематологические исследования

Общий клинический анализ крови
Цельная кровь
Пробирка с К2/К3 ЭДТА **900**
1 сут.

Общий клинический анализ крови
(подсчет форменных элементов крови)
Цельная кровь **450**
1 сут.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Гематокрит
Цельная кровь **250**
1 ч.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Лейкоцитарная формула крови с морфологией клеток
Цельная кровь **450**
1 сут.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Ретикулоциты (ручной подсчет)
Цельная кровь **385**
1 сут.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Перекрестная проба на совместимость крови
Цельная кровь **900**
1 ч.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Исследование на кровепаразитов (бабезиоз)
Цельная кровь **500**
1 сут.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Исследование на наличие микрофилярий в мазке крови
Цельная кровь **500**
1 сут.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Диагностика микрофилярий методом Кнотта
Цельная кровь **500**
1 сут.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

Исследование гемостаза

Коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, фибриноген)
Плазма крови **1500**
Пробирка с цитратом натрия 3,2% (3,8%).
Плазму отделить центрифугированием и перелить в пробирку
без наполнителя до **1 сут.**

Протромбиновое время + активированное частичное
тромбиновое время (ПВ + АЧТВ)
Плазма крови
Пробирка с цитратом натрия 3,2% (3,8%).
Плазму отделить центрифугированием и перелить в пробирку
без наполнителя

800
до
1 сут.

Количество тромбоцитов (ручной подсчет)
Цельная кровь
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

185
1 сут.

Биохимическое исследование крови

Биохимическое исследование крови 1 показатель
(мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий
белок, альбумин, ГГТ, амилаза, фосфор, холестерин, магний,
билирубин, триглицериды, общая креатинкиназа, мочева
кислота)
Сыворотка
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка
с активатором свертывания

200
1 сут.

Профиль №1: 10 показателей + электролиты (мочевина,
креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок,
альбумин, ГГТ, фосфор, билирубин + К, Са, Na, Cl)
Сыворотка + плазма
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка
с активатором свертывания + пробирка с литий гепарином
и гелем/пробирка с литий гепарином

1000
1 сут.

Профиль №2: 6 показателей + коагулограмма
(мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная
фосфатаза, общий белок + ПВ, АЧТВ)
Сыворотка + плазма

800
1 сут.

Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором
свертывания + пробирка с цитратом натрия 3,2% (3,8%).
Плазму отделить центрифугированием и перелить в пробирку
без наполнителя

Профиль №3: 5 показателей + электролиты (мочевина,
креатинин, общий белок, альбумин, фосфор + К, Са, Na, Cl)
Сыворотка + плазма

1100
1 сут.

Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором
свертывания + пробирка с литий гепарином и гелем/пробирка с литий
гепарином

Профиль №4: 11 показателей (АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, ГГТ, амилаза, холестерин, триглицериды, билирубин, желчные кислоты)

Сыворотка

Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором свертывания

900

1 сут.

Профиль №5: 5 показателей + электролиты (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, магний, фосфор + К, Са, Na, Cl)

Сыворотка + плазма

Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором свертывания + пробирка с литий гепарином и гелем/пробирка с литий гепарином

1200

1 сут.

Профиль №6: 15 показателей + электролиты (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, ГГТ, амилаза, фосфор, холестерин, магний, билирубин, триглицериды, общая креатинкиназа + К, Са, Na, Cl)

Сыворотка + плазма

Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором свертывания + пробирка с литий гепарином и гелем/пробирка с литий гепарином

1800

1 сут.

Профиль "Срочный": 7 показателей + электролиты + клинический анализ крови (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин + К, Са, Na, Cl + только подсчет форменных элементов цельной крови)

Сыворотка + плазма + цельная кровь

Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором свертывания + пробирка с литий гепарином + K2/K3 ЭДТА

3000

1 ч. с момента поступления в лабораторию

Электролиты (К, Са, Na, Cl)

Плазма

Пробирка с литий гепарином и гелем/пробирка с литий гепарином

550

1 сут.

Ионизированный кальций

Плазма

Пробирка с литий гепарином и гелем. Забор строго вакуумно, центрифугировать, крышку не открывать

600

1 сут.

Глюкоза

Плазма

Натрия фторид/Калия оксалат

200

1 сут.

Железо
Сыворотка **185**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 1 сут.
с активатором свертывания

Желчные кислоты
Сыворотка **900**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 1 сут.
с активатором свертывания

Желчные кислоты (двукратный)
Сыворотка **1300**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 1 сут.
с активатором свертывания

C-реактивный белок
Сыворотка **1735**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 1 сут.
с активатором свертывания

Сывороточный амилоид кошек
Сыворотка **1535**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 1 сут.
с активатором свертывания

Липаза панкреатическая собаки
Сыворотка **3000**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 2 сут.
с активатором свертывания

Липаза панкреатическая кошки
Сыворотка **3000**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 2 сут.
с активатором свертывания

SDMA (Симметричный диметиларгинин)
Сыворотка **1900**
Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка 2 сут.
с активатором свертывания

Общие клинические и биохимические исследования мочи

Общий клинический анализ мочи
Моча **550**
Пробирка с консервантом. **Нельзя использовать борную кислоту (консервант).** Стерильный контейнер без консерванта - только при хранении не более 3-х часов 1 сут.

Плотность мочи Моча Стерильный контейнер или пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант)	200 1 сум.
Кетоны в моче Моча Стерильный контейнер или пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант)	250 1 сум.
Соотношение белок/креатинин в моче (без анализа мочи) Моча Стерильный контейнер или пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант)	200 1 сум.
Соотношение желчные кислоты/креатинин в моче Моча Стерильный контейнер или пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант)	900 1 сум.
Парциальная экскреция электролитов с мочой (K, Ca, Na,Cl) Моча + сыворотка крови + плазма крови Стерильный контейнер. Нельзя использовать борную кислоту (консервант) + пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором свертывания + пробирка с литий гепарином и гелем/пробирка с литий гепарином	900 1 сум.
Соотношение гГТ/креатинин в моче Моча Стерильный контейнер или пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант)	500 1 сум.
Соотношение кортизол/креатинин в моче Моча Стерильный контейнер или пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант)	1600 до 4 сум.
Клинические исследования кала	
Скрытая кровь в кале (требует предварительной подготовки животного) Фекалии Стерильный контейнер	200 1 сум.
Паразитологическое исследование кала Фекалии Стерильный контейнер	600 1 сум.

Экспресс-тесты

Экспресс-тест Панлейкопения <i>Фекалии</i> <i>Стерильный контейнер</i>	1300 <i>15 мин.</i>
Экспресс-тест Парвовирус <i>Фекалии</i> <i>Стерильный контейнер</i>	1300 <i>15 мин.</i>
Экспресс-тест ВИК, ВЛК <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	1500 <i>15 мин.</i>
Определение групп крови у кошек <i>Цельная кровь</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА</i>	2500 <i>30 мин.</i>
Определение DEA1 антигена у собак <i>Цельная кровь</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА</i>	2500 <i>30 мин.</i>
Прямой антиглобулиновый тест <i>Цельная кровь</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА</i>	4000 <i>1 ч.</i>
Экспресс проба с АКГГ <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	3000 <i>1 сут.</i>
Экспресс МДП (малая дексаметазоновая проба) <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	4000 <i>1 сут.</i>
Тропонин I (кардиомаркер) <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	2000 <i>1 сут.</i>

Клинические исследования для лошадей

Общий клинический анализ крови <i>Цельная кровь</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА</i>	900 <i>1 сут.</i>
Биохимическое исследование крови: 11 показателей (мочевина, креатинин, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, ГГТ, фосфор, магний, билирубин, креатинкиназа общая) <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором свертывания</i>	1300 <i>1 сут.</i>

Биохимическое исследование крови: 11 показателей + электролиты (мочевина, креатинин, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, ГГТ, фосфор, магний, билирубин, креатинкиназа общая + K, Ca, Na, Cl) <i>Сыворотка + плазма</i> <i>Пробирка с активатором свертывания и гелем/пробирка с активатором свертывания + пробирка с литий гепарином и гелем/пробирка с литий гепарином</i>	1700 <i>1 сут.</i>
Общий клинический анализ мочи <i>Моча</i> <i>Пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант). Стерильный контейнер без консерванта - только при хранении не более 3-х часов</i>	550 <i>1 сут.</i>
Паразитологическое исследование кала <i>Фекалии</i> <i>Стерильный контейнер</i>	600 <i>1 сут.</i>
Трихоскопия волоса <i>Шерсть</i> <i>Эппендорф/стерильный контейнер</i>	500 <i>3 сут.</i>
Цитологическое исследования глубокого соскоба кожи <i>Цитологический материал на стеклах</i> <i>Пенал со стеклами</i>	900 <i>3 сут.</i>
Определение гормонов	
T4 общий (тироксин) <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	1635 <i>3 сут.</i>
ТТГ собак <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	1535 <i>3 сут.</i>
T4 общий (тироксин) + ТТГ собак <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	2400 <i>3 сут.</i>
Паратгормон <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	2000 <i>3 сут.</i>
Базовый кортизол (Pre-vetoryl) <i>Сыворотка</i> <i>Пробирка с активатором свертывания</i>	1000 <i>3 сут.</i>

Проба с АКТГ (2 определения кортизола) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	1300 3 сут.
---	-----------------------

Малая/большая дексаметазоновая проба Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	1700 3 сут.
---	-----------------------

Прогестерон Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	1535 1 сут.
--	-----------------------

Патоморфологические исследования

Цитологические исследования

Окраска материала по Граму, определение принадлежности бактерий Грам"-"/Грамм "+" Стекла с препаратом или нативный материал Пенал со стеклами или в зависимости от материала	500 1 сут.
--	----------------------

Цитология ТИБ (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга) Стекла с препаратом (минимум 2, лучше 3-4) Пенал со стеклами	900 3-5 сут.
---	------------------------

Цитологическое исследование (костный мозг) Стекла с мазками костного мозга, костный мозг в ЭДТА + ОАК. Весь материал должен быть собран в один день Пенал со стеклами + пробирка с К2/К3 ЭДТА с костным мозгом + пробирка с К2/К3 ЭДТА с ОАК + результаты ОАК (не позднее 24 ч) или за доп.оплату заказ ОАК	2570 5 сут.
---	-----------------------

Вагинальная цитология (не опухолевая) Стекло с мазком Пенал со стеклами	500 1 сут.
---	----------------------

Цитологическое исследование мочи Моча Стерильный контейнер или пробирка с консервантом. Нельзя использовать борную кислоту (консервант)	700 3 сут.
---	----------------------

Исследование ликвора Ликвор Пробирка с К2/К3 ЭДТА	735 1 сут.
---	----------------------

Исследование синовиальной жидкости Синовия Пробирка с К2/К3 ЭДТА	735 3-5 сут.
--	------------------------

Исследование выпотных жидкостей (плевральной, перикардиальной, перитонеальной) <i>Жидкость выпотная</i> <i>Пробирка К2/К3 ЭДТА + пробирка с активатором свертывания</i>	1170 1 сут.
---	-----------------------

Исследование транстрахеального аспирата/ бронхоальвеолярного лаважа. Цитология. <i>Жидкость после БАЛ</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА</i>	850 3-5 сут.
--	------------------------

Цитологическое исследование крови <i>Мазок крови на стекле с щеточкой в момент взятия крови (2-3шт) + пробирка с кровью на ОАК</i> <i>Пробирка К2/К3 ЭДТА + пенал со стеклами</i>	700 3-5 сут.
---	------------------------

Цитология раневого отделяемого <i>Содержимое ран, абсцессов, флегмон, гематом</i> <i>Пробирка К2ЭДТА/К3ЭДТА + пенал со стеклами</i>	700 3 сут.
---	----------------------

Гистологические исследования

Гистология (Laboklin) <i>Материал в 10%-м формалине</i> <i>Специальный гистологический контейнер</i>	4100 до 21 сут., костная ткань до 45 сут.
--	---

Гистология (Дуокор Лаб) Только молочная железа и опухоли кожи! <i>Материал в 10%-м формалине</i> <i>Специальный гистологический контейнер</i>	4100 до 21 сут.
---	------------------------------

Иностранный патолог (Германия) <i>Материал в 10%-м формалине</i> <i>Специальный гистологический контейнер</i>	10000 до 21 сут., костная ткань до 45 сут.
---	--

Дополнительная окраска гистоматериала (медь (роданин), амилоид (конго красный), тучные клетки (толуидиновый синий), ШИК/PAS, кислотоустойчивые бактерии (Циль-Нильсен), грибки (Гомори-Грокотт), железо (Перльс-Ван-Гизон)) <i>Готовые гистоблоки</i>	1200 15-20 сут.
--	------------------------------

ИГХ 1 окраска (Биоконтроль) <i>Материал в 10%-м формалине, парафиновые блоки</i> <i>Специальный гистологический контейнер</i>	3500 14-21 сут.
---	------------------------------

Микробиология

Иммуноферментная диагностика инфекционных заболеваний

Диагностика вирусного иммунодефицита кошек (определение уровня IgG к <i>Feline immunodeficiency virus</i>) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2235 3 сут.
Диагностика вирусного лейкоза кошек (определение уровня белка р27) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2535 3 сут.
Диагностика герпесвируса собак (определение уровня IgG к <i>Canine herpesvirus</i>) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	1135 3 сут.
Диагностика коронавирусной инфекции кошек (определение уровня IgG к <i>Feline coronavirus</i>) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	3335 3 сут.
Диагностика токсоплазмоза (определение уровня IgG к <i>Toxoplasma gondii</i>) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	1135 3 сут.
Диагностика токсоплазмоза (определение уровня IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2035 3 сут.
Диагностика токсоплазмоза (определение уровня IgG + IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2535 3 сут.
Диагностика дирофиляриоза (определение Ag к дирофилярии) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2200 3 сут.
Диагностика бруцеллеза (определение уровня IgG к <i>Brucella canis</i>) (Иммунокомб) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2100 1 сут.

Диагностика лептоспироза (определение уровня IgG к патогенным серотипам <i>Leptospira interrogans</i>) (Иммунокомб) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2100 1 сут.
Диагностика эрлихиоза (определение уровня IgG <i>Ehrlichia canis</i>) (Иммунокомб) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2200 1 сут.
Оценка напряженности иммунитета к возбудителям панлейкопении, вирусного ринотрахеита и калицивируса кошек (Вакцичек) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2135 1 сут.
Оценка напряженности иммунитета к возбудителям гепатита, парвовирусной инфекции и чумы собак (Вакцичек) Сыворотка Пробирка с активатором свертывания	2135 1 сут.

Бактериология

Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам Моча Пробирка УРОТ, пробирка с борной кислотой, пробирка с жидкой средой Эймса	1900 до 6 сут.
Экспресс-посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам Моча Пробирка УРОТ, пробирка с борной кислотой, пробирка с жидкой средой Эймса	2100 до 3 сут.
Посев стерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам Желчь, слизистая мочевого пузыря, сперма/простатическая фракция, киста простаты, аспират полостей тела (торакальная, перитонеальная, перикардальная), синовия, содержимое гигромы, серомы, биоптат/эндоскопический выщип, раневое отделяемое при оперативном вмешательстве, венозный катетер, контроль микрофлоры при установке металлоконструкции Пробирка с жидкой средой Эймса	2700 до 6 сут.

Экспресс-посев стерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам

Жель, слизистая мочевого пузыря, сперма/простатическая фракция, киста простаты, аспират полостей тела (торакальная, перитонеальная, перикардальная), синовия, содержимое гигромы, серомы, биоптат/эндоскопический выщип, раневое отделяемое при оперативном вмешательстве, венозный катетер, контроль микрофлоры при установке металлоконструкции
Пробирка с жидкой средой Эймса

3500
до
3 сут.

Посев нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам

Материалы, полученные при отоскопии, риноскопии, бронхоскопии, раневое отделяемое, отделяемое наружного слухового прохода, отделяемое глаз
Пробирка с жидкой средой Эймса

3000
до
6 сут.

Экспресс-посев нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам

Материалы, полученные при отоскопии, риноскопии, бронхоскопии, раневое отделяемое, отделяемое наружного слухового прохода, отделяемое глаз
Пробирка с жидкой средой Эймса

3700
до
3 сут.

Посев ликвора на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам

Ликвор
Специальный флакон

2600
до
6 сут.

Дополнительный посев на анаэробы

Раневое отделяемое, перитонеальная жидкость, торакальная жидкость, перикардальная жидкость, желчь
Пробирка с жидкой средой Эймса

1500
до
6 сут.

Посев крови на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам

Сепсис - 4 флакона, эндокардит - 6 флаконов
Специальные флаконы

5500
до
6 сут.

Посев на дерматомикозы

Шерсть
Эппендорф/стерильный контейнер

1000
до
21 сут.

Обнаружение генетических маркеров резистентности к карбапенемам у грамотрицательных микроорганизмов (ПЦР) <i>Прямое определение из клинического материала, определение из чистой культуры микроорганизма</i>	2000 до 2 сут.
Определяемые карбапенемазы: карбапенемазы групп KPC, OXA (OXA-48 и OXA-162), VIM, IMP, NDM, OXA-23, OXA-58, OXA-40 <i>Прямое определение из клинического материала, определение из чистой культуры микроорганизма</i>	2000 до 2 сут.
Определение чувствительности к бактериофагам	500 до 2 сут.
Определение остаточной антимикробной активности в моче <i>Моча</i> <i>Пробирка УРОТ, пробирка с борной кислотой, пробирка с жидкой средой Эймса</i>	500 до 2 сут.
Определение остаточной антимикробной активности в биологических жидкостях <i>Жель, аспират полостей тела (торакальная, перитонеальная, перикардальная), синовия, БАЛ</i> <i>Пробирка с жидкой средой Эймса</i>	1500 до 2 сут.

ПЦР-диагностика

Собаки

Аденовирус собак 1-го типа (<i>Canine adenovirus type 1</i>) <i>Цельная кровь, сыворотка крови, фекалии, соскоб кишечный</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА, пробирка с активатором свертывания, стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой</i>	600 до 48 ч.
Аденовирус собак 2-го типа (<i>Canine adenovirus type 2</i>) <i>БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, отделяемое глаз, смывы с конъюнктивы</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой</i>	600 до 48 ч.
Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум (<i>Anaplasma platys/Anaplasma phagocitophilum</i>) <i>Цельная кровь, клещ, синовия</i> <i>Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф</i>	800 до 48 ч.
Анаплазма/Эрилихия (<i>Anaplasma spp./Ehrlichia spp.</i>) <i>Клещ</i> <i>Эппендорф/стерильный контейнер</i>	800 до 48 ч.

Аспергиллы (<i>Aspergillus fumigatus/flavus/terreus/niger</i>) БАЛ, эпителий носовой полости, носоглотки, биоптат пораженных тканей Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	800 до 48 ч.
Бабезия (<i>Babesia spp.</i>) Цельная кровь, клещ Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф	600 до 48 ч.
Бабезия Гибсона (<i>Babesia gibsoni</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Бартонелла (<i>Bartonella spp.</i>) Цельная кровь, эпителий ротовой полости, биоптат пораженных тканей, клещ Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Бордетелла бронхисептика (<i>Bordetella bronchiseptica</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Боррелия бургдорфери (<i>Borrelia burgdorferi</i>) Клещ, синовия Эппендорф, пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Бруцелла (<i>Brucella spp.</i>) Цельная кровь, биоптат пораженных тканей, абортированные плоды, плодные оболочки, плацента, синовия, сперма/выделения из влагалища Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Вирус болезни Ауески (<i>Suid alphaherpesvirus 1/Suid herpesvirus 1</i>) Аутоптат пораженных тканей Эппендорф с транспортной средой	800 до 48 ч.
Вирус парагриппа собак (<i>Canine parainfluenza virus</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Вирус чумы собак (<i>Canine distemper virus</i>) Цельная кровь, сыворотка крови, фекалии, соскоб кишечный, БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, отделяемое глаз, смывы с конъюнктивы Пробирка с К2/К3 ЭДТА, пробирка с активатором свертывания, стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.

Гемотропная микоплазма собак (<i>Mycoplasma haemocanis</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Гепатозоон собак (<i>Hepatozoon canis</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Герпесвирус собак (<i>Canine herpesvirus</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, эпителий ротовой полости, смыв с препуция Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Гиардия/Лямблия (<i>Giardia spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Дирофилярия иммитис/Дирофилярия репенс (<i>Dirofilaria immitis/Dirofilaria repens</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	800 до 48 ч.
Кампилобактер (<i>Campylobacter spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный, биоптаты пораженных тканей, желчь Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой, пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Коронавирус собак (<i>Canine coronavirus</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Криптококк неоформанс (<i>Cryptococcus neoformans</i>) Ликвор, БАЛ, биоптат пораженных тканей Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	1000 до 48 ч.
Криптоспоридия (<i>Cryptosporidium spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Лейшмания (<i>Leishmania spp.</i>) Цельная кровь, костный мозг, биоптат лимфатического узла, соскоб с поражений на коже, смыв с конъюнктивы Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Малассезия пахидерматис (<i>Malassezia pachydermatis</i>) Соскоб с кожи, кожные чешуйки Стерильный контейнер	800 до 48 ч.

Микобактерии (*Mycobacterium spp.*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, эпителий ротовой полости, биоптат пораженных тканей, соскоб с кожи
Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер

600

до
48 ч.

Микобактерия туберкулёза (*Mycobacterium tuberculosis complex*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, эпителий ротовой полости, биоптат пораженных тканей, соскоб с кожи
Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер

600

до
48 ч.

Микоплазма собак (*Mycoplasma canis*)

Смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, биоптат пораженных тканей
Эппендорф с транспортной средой

600

до
48 ч.

Микоплазма собак/Микоплазма цинос

(*Mycoplasma canis*/*Mycoplasma cynos*)

Смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, биоптат пораженных тканей
Эппендорф с транспортной средой

800

до
48 ч.

Микоплазма цинос (*Mycoplasma cynos*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, биоптат пораженных тканей
Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

600

до
48 ч.

Микроспорум (*Microsporium spp.*)

Соскоб с кожи, кожные чешуйки, шерсть
Стерильный контейнер

600

до
48 ч.

Микроспорум канис/Микроспорум гипсеум (*Microsporium canis*/*Microsporium gypseum*)

Соскоб с кожи, кожные чешуйки, шерсть
Стерильный контейнер

800

до
48 ч.

Неоспора собак (*Neospora caninum*)

Ликвор
Пробирка с К2/К3 ЭДТА

1000

до
48 ч.

Парвовирус собак (*Canine parvovirus*)

Цельная кровь, фекалии, соскоб кишечный
Пробирка с К2/К3 ЭДТА, стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой

600

до
48 ч.

Пастерелла мультацида/Маннхемия гемолизная (<i>Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Патогенные лептоспиры (<i>Pathogenic Leptospira</i>) Цельная кровь, биоптат пораженных тканей, моча Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Ротавирус А (<i>Rotavirus A</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Сальмонелла (<i>Salmonella spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Токсины клостридии диффициле (<i>Clostridium difficile</i> <i>tcdA/tcdB/CDT</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Токсоплазма гондии (<i>Toxoplasma gondii</i>) Сыворотка крови, фекалии, соскоб кишечный Пробирка с активатором свертывания, стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Трихофитон (<i>Trichophyton spp.</i>) Соскоб с кожи, кожные чешуйки, шерсть Стерильный контейнер	800 до 48 ч.
Хламидия (<i>Chlamydia spp.</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, отделяемое глаз, смывы с конъюнктивы Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Энтеротоксин клостридии перфрингенс (<i>Clostridium perfringens</i> <i>enterotoxin</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Эрлихия канис (<i>Ehrlichia canis</i>) Цельная кровь, клещ Пробирка с К2/К3 ЭДТА, стерильный контейнер	600 до 48 ч.

Комплексы для собак

Кровепаразитарный малый профиль:

Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум

(*Anaplasma platys*/*Anaplasma phagocitophilum*)

Эрлихия (*Ehrlichia canis*)

Бабезия (*Babesia spp.*)

Цельная кровь

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

1600

до

48 ч.

Кровепаразитарный расширенный профиль:

Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум

(*Anaplasma platys*/*Anaplasma phagocitophilum*)

Эрлихия (*Ehrlichia canis*)

Бабезия (*Babesia spp.*)

Бабезия Гибсона (*Babesia gibsoni*)

Гемотропная микоплазма собак (*Mycoplasma haemocanis*)

Дирофилярия иммитис/Дирофилярия репенс

(*Dirofilaria immitis*/*Dirofilaria repens*)

Цельная кровь

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

3500

до

48 ч.

Репродуктологический профиль (кобель перед вязкой):

ИФА-диагностика *Brucella canis* (IgG),

ПЦР спермы на бруцеллу (*Brucella spp.*)

Посев спермы

Сперма + сыворотка крови

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, пробирка с активатором свертывания,

пробирка с жидкой средой Эймса

5000

до

48 ч.

Репродуктологический профиль (сука перед вязкой):

ИФА-диагностика *Brucella canis* (IgG)

ИФА-диагностика герпесвируса собак

(определение уровня антител к *Canine herpesvirus*),

ПЦР течных выделений на бруцеллу (*Brucella spp.*)

Выделения из влагалища + сыворотка крови

Эппендорф с транспортной средой, пробирка с активатором свертывания

3700

до

48 ч.

Желудочно-кишечный малый профиль:

Сальмонелла (*Salmonella spp.*)

Кампилобактер (*Campylobacter spp.*),

Энтеротоксин клостридии перфрингенс

(*Clostridium perfringens enterotoxin*)

Фекалии, соскоб кишечный

Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой

1500

до

48 ч.

Желудочно-кишечный расширенный профиль:

Сальмонелла (*Salmonella* spp.)

Кампилобактер (*Campylobacter* spp.)

Энтеротоксин клостридии перфрингенс
(*Clostridium perfringens enterotoxin*)

Парвовирус собак (*Canine parvovirus*)

Вирус чумы собак (*Canine distemper virus*)

Криптоспоридия (*Cryptosporidium* spp.)

Фекалии, соскоб кишечный

Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой

3000

до

48 ч.

Респираторный малый профиль:

Аденовирус собак 2-го типа (*Canine adenovirus type 2*)

Бордетелла бронхисептика (*Bordetella bronchiseptica*)

Вирус парагриппа собак (*Canine parainfluenza virus*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

1500

до

48 ч.

Респираторный большой профиль:

Аденовирус собак 2-го типа (*Canine adenovirus type 2*)

Бордетелла бронхисептика (*Bordetella bronchiseptica*)

Вирус парагриппа собак (*Canine parainfluenza virus*)

Герпесвирус собак (*Canine herpesvirus*)

Микоплазма цинос (*Mycoplasma cynos*)

Вирус чумы собак (*Canine distemper virus*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

3000

до

48 ч.

Комплекс БАЛ (Профиль БАЛ):

Малый респираторный профиль ПЦР

Посев нестерильного материала

Цитологическое исследование

БАЛ

Эппендорф с транспортной средой, пробирка с жидкой средой Эймса,

пробирка с К2/К3 ЭДТА

5000

до

48 ч.

Неврологический профиль:

Анаплазма фагоцитофилум (*Anaplasma phagocitophilum*)

Боррелия бургдорфери (*Borrelia burgdorferi*)

Вирус чумы собак (*Canine distemper virus*)

Неоспора собак (*Neospora caninum*)

Токсоплазма гондии (*Toxoplasma gondii*)

Ликвор

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

2500

до

48 ч.

Исследование клеща комплекс:

Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум

(*Anaplasma platys*/*Anaplasma phagocitophilum*)

Бабезия (*Babesia spp.*)

Боррелия бургдорфери (*Borrelia burgdorferi*)

Эрлихия (*Ehrlichia canis*)

Клещ

Стерильный контейнер

2000

до

48 ч.

Диагностика дерматофитии:

Малассезия пахидерматис (*Malassezia pachydermatis*)

Микроспорум канис/Микроспорум гипсеум

(*Microsporum canis*/*Microsporum gypseum*)

Трихофитон (*Trichophyton spp.*)

Посев на дерматофиты

Соскоб с кожи, шерсть

Стерильный контейнер

3000

до

48 ч.

Кошки

Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум

(*Anaplasma platys*/*Anaplasma phagocitophilum*)

Цельная кровь, клещ, синовия, костный мозг

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, стерильный контейнер, материал на стеклах

(костный мозг)

800

до

48 ч.

Аспергиллы (*Aspergillus fumigatus/flavus/terreus/niger*)

БАЛ, эпителий носовой полости, носоглотки, биоптат пораженных тканей

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

800

до

48 ч.

Бабезия (*Babesia spp.*)

Цельная кровь

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

600

до

48 ч.

Бартонелла (*Bartonella spp*)

Цельная кровь, эпителий ротовой полости, соскоб с язв, синовия, ликвор

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

600

до

48 ч.

Бордетелла бронхисептика (*Bordetella bronchiseptica*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

600

до

48 ч.

Бруцелла (*Brucella spp.*)

Цельная кровь

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

600

до

48 ч.

Вирус болезни Ауески (<i>Suid alphaherpesvirus 1/Suid herpesvirus 1</i>) Аутопнат пораженных тканей Эппендорф с транспортной средой	800 до 48 ч.
Вирус иммунодефицита кошек (<i>Feline immunodeficiency virus</i>) Цельная кровь, костный мозг Пробирка с К2/К3 ЭДТА, материал на стеклах (костный мозг)	600 до 48 ч.
Вирус лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>) - определение вирусной РНК Сыворотка крови Пробирка с активатором свертывания	600 до 48 ч.
Вирус лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>) - количественное определение вирусной РНК Сыворотка крови Пробирка с активатором свертывания	1200 до 48 ч.
Вирус лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>) - определение провирусной ДНК Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Вирус лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>) определение провирусной ДНК + вирусной РНК Цельная кровь + сыворотка крови Пробирка с К2/К3 ЭДТА, пробирка с активатором свертывания	800 до 48 ч.
Вирус панлейкопении кошек (<i>Feline panleukopenia virus</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Гепатозоон собак (<i>Hepatozoon canis</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Герпесвирус кошек (<i>Feline herpesvirus</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, эпителий ротовой полости, отделяемое глаз, смыв с конъюнктивы Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Гиардия/Лямблиоз (<i>Giardia spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.

Дирофилярия иммитис/Дирофилярия репенс (<i>Dirofilaria immitis/Dirofilaria repens</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	800 до 48 ч.
Калицивирус кошек (<i>Feline calicivirus</i>) Цельная кровь, БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, отделяемое глаз, смыв с конъюнктивы, биоптат пораженных тканей, эпителий ротовой полости, соскоб с язв Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Кампилобактер (<i>Campylobacter spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный, биоптат пораженных тканей, желчь Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой, пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Коронавирус кошек (<i>Feline Coronavirus</i>) - носительство Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Коронавирус кошек (<i>Feline Coronavirus</i>) Выпот, биоптат лимфатического узла, содержимое задней камеры глаза Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Криптококк неоформанс (<i>Cryptococcus neoformans</i>) Цельная кровь, БАЛ, ликвор, биоптаты пораженных тканей Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	1000 до 48 ч.
Криптоспоридия (<i>Cryptosporidium spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Лейшмания (<i>Leishmania spp.</i>) Цельная кровь, костный мозг, биоптат лимфатического узла, соскоб с поражений на коже, смыв с конъюнктивы Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Малассезия пахидерматис (<i>Malassezia pachydermatis</i>) Соскоб с кожи, кожные чешуйки Стерильный контейнер	800 до 48 ч.
Микобактерии (<i>Mycobacterium spp.</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, эпителий ротовой полости, биоптат пораженных тканей, соскоб с кожи Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.

Микобактерия туберкулёза (<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, эпителий ротовой полости, биоптат пораженных тканей, соскоб с кожи Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Микоплазма кошек (<i>Mycoplasma felis</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, отделяемое глаз, смыв с конъюнктивы Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Микроспорум (<i>Microsporium spp.</i>) Соскоб с кожи, кожные чешуйки, шерсть Стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Микроспорум канис/Микроспорум гипсеум (<i>Microsporium canis/Microsporium gypseum</i>) Соскоб с кожи, кожные чешуйки, шерсть Стерильный контейнер	800 до 48 ч.
Пастерелла мультацида/Маннхемия гемолитика (<i>Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Патогенные лептоспиры (<i>Pathogenic Leptospira</i>) Цельная кровь, биоптат пораженных тканей, моча Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой, стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Ротавирус А (<i>Rotavirus A</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Сальмонелла (<i>Salmonella spp.</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Токсины клостридии диффициле (<i>Clostridium difficile tcdA/tcdB/CDT</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Токсоплазма гондии (<i>Toxoplasma gondii</i>) Сыворотка крови, фекалии, соскоб кишечный Пробирка с активатором свертывания, стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.

Тритрихомонас фетус (<i>Tritrichomonas foetus</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Трихофитон (<i>Trichophyton spp.</i>) Соскоб с кожи, кожные чешуйки, шерсть Стерильный контейнер	800 до 48 ч.
Хламидия кошек (<i>Chlamydia felis</i>) БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки, отделяемое глаз, смыв с конъюнктивы, биоптат пораженных тканей Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Энтеротоксин клостридии перфрингенс (<i>Clostridium perfringens enterotoxin</i>) Фекалии, соскоб кишечный Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Эрлихия собак (<i>Ehrlichia canis</i>) Цельная кровь, клещ Пробирка с К2/К3 ЭДТА, стерильный контейнер	600 до 48 ч.

Комплексы для кошек

Гемотропные микоплазмы кошек (<i>Haemotropic Mycoplasmas: Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	1100 до 48 ч.
Кровепаразитарный малый профиль: Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум (<i>Anaplasma platys/Anaplasma phagocitophilum</i>) Эрлихия (<i>Ehrlichia canis</i>) Бабезия (<i>Babesia spp.</i>) Цельная кровь Пробирка с К2/К3 ЭДТА	1600 до 48 ч.
Репродуктологический профиль (перед вязкой): Вирус лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>) определение провирусной ДНК + вирусной РНК ИФА определение антител к вирусу иммунодефицита кошек Группа крови (экспресс-тест) Цельная кровь + сыворотка крови Пробирка с К2/К3 ЭДТА, пробирка с активатором свертывания	4700 до 48 ч.

Анемия кошки:

Вирус лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>)	
определение провирусной ДНК + вирусной РНК	3600
Гемотропные микоплазмы кошек	до
ИФА определение антител к вирусу иммунодефицита кошек	48 ч.
Цельная кровь + сыворотка крови	
Пробирка с К2/К3 ЭДТА, пробирка с активатором свертывания	

Перед химиотерапией:

Вирус лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>)	
определение провирусной ДНК + вирусной РНК	3000
ИФА определение антител к вирусу иммунодефицита кошек	до
Цельная кровь + сыворотка крови	48 ч.
Пробирка с К2/К3 ЭДТА, пробирка с активатором свертывания	

Глазной профиль:

Хламидия (<i>Chlamydia felis</i>)	1000
Герпесвирус кошек (<i>Feline herpesvirus</i>)	до
Отделяемое глаз, смыв с конъюнктивы	48 ч.
Эппендорф с транспортной средой	

Желудочно-кишечный малый профиль:

Кампилобактер (<i>Campylobacter spp.</i>)	
Энтеротоксин клостридии перфрингенс (<i>Clostridium perfringens enterotoxin</i>)	1500
Тритрихомонас фетус (<i>Tritrichomonas foetus</i>)	до
Фекалии, соскоб кишечный	48 ч.
Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	

Желудочно-кишечный профиль большой:

Кампилобактер (<i>Campylobacter spp.</i>)	
Энтеротоксин клостридии перфрингенс (<i>Clostridium perfringens enterotoxin</i>)	
Тритрихомонас фетус (<i>Tritrichomonas foetus</i>)	3500
Коронавирус кошек (<i>Feline Coronavirus</i>)	до
Вирус панлейкопении кошек (<i>Feline panleukopenia virus</i>)	48 ч.
Токсоплазма гондии (<i>Toxoplasma gondii</i>)	
Криптоспоридия (<i>Cryptosporidium spp.</i>)	
Сальмонелла (<i>Salmonella spp.</i>)	
Фекалии, соскоб кишечный	
Стерильный контейнер, эппендорф с транспортной средой	

Респираторный малый профиль:

Герпесвирус кошек (*Feline herpesvirus*)

Калицивирус кошек (*Feline calicivirus*)

Бордетелла бронхисептика (*Bordetella bronchiseptica*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

1500

до
48 ч.

Респираторный большой профиль:

Герпесвирус кошек (*Feline herpesvirus*)

Калицивирус кошек (*Feline calicivirus*)

Бордетелла бронхисептика (*Bordetella bronchiseptica*)

Микоплазма кошек (*Mycoplasma felis*)

Хламидия (*Chlamydia felis*)

БАЛ, смыв с ВДП, эпителий носовой полости, носоглотки

Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой

2500

до
48 ч.

Комплекс БАЛ (Профиль БАЛ):

Малый респираторный профиль ПЦР

Посев нестерильного материала

Цитологическое исследование

БАЛ

Эппендорф с транспортной средой, пробирка с жидкой средой Эймса,

пробирка с К2/К3 ЭДТА

5000

до
48 ч.

Неврологический профиль:

Бартонелла (*Bartonella spp.*)

Вирус иммунодефицита кошек (*Feline immunodeficiency virus*)

Вирус лейкемии кошек (*Feline leukemia virus*) - определение

провирусной ДНК

Коронавирус кошек (*Feline Coronavirus*)

Токсоплазма гондии (*Toxoplasma gondii*)

Ликвор

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

2500

до
48 ч.

Исследование клеща комплекс:

Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум

(*Anaplasma platys*/*Anaplasma phagocitophilum*)

Бабезия (*Babesia spp.*)

Боррелия бургдорфери (*Borrelia burgdorferi*)

Эрлихия (*Ehrlichia canis*)

Клещ

Стерильный контейнер

2000

до
48 ч.

Диагностика дерматофитии

Малассезия пахидерматис (*Malassezia pachydermatis*)

Микроспорум канис/Микроспорум гипсеум

(*Microsporum canis*/*Microsporum gypseum*)

Трихофитон (*Trichophyton spp.*)

Посев на дерматофиты

Соскоб с кожи, шерсть

Стерильный контейнер

3000

ПЦР

до

48 ч.

Посев

до

21 сут.

Птицы

Криптоспоридия (*Cryptosporidium spp.*)

Помёт

Стерильный контейнер

600

до

48 ч.

Гиардия/Лямблия (*Giardia spp.*)

Помёт

Стерильный контейнер

600

до

48 ч.

Микобактерия туберкулёза (*Mycobacterium tuberculosis complex*)

Помёт

Стерильный контейнер

600

до

48 ч.

Сальмонелла (*Salmonella spp.*)

Помёт

Стерильный контейнер

600

до

48 ч.

Хламидия пситтаци (*Chlamydophila psittaci*)

Помёт

Стерильный контейнер

600

до

48 ч.

Криптококк неоформанс (*Cryptococcus neoformans*)

Помёт

Стерильный контейнер

1000

до

48 ч.

Лошади

Анаплазма платис/Анаплазма фагоцитофилум

(*Anaplasma platys*/*Anaplasma phagocitophilum*)

Цельная кровь

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

800

до

48 ч.

Бабезия (*Babesia spp.*)

Цельная кровь

Пробирка с К2/К3 ЭДТА

600

до

48 ч.

Бордетеллез (<i>Bordetella bronchiseptica</i>) БАЛ, эпителий носовой полости, носоглотки Пробирка с К2/К3 ЭДТА, эппендорф с транспортной средой	600 до 48 ч.
Микобактерия туберкулёза (<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>) Выпот Пробирка с К2/К3 ЭДТА	600 до 48 ч.
Ротавирус А (<i>Rotavirus A</i>) Фекалии Стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Сальмонелла (<i>Salmonella spp.</i>) Фекалии Стерильный контейнер	600 до 48 ч.
Кампилобактер (<i>Campylobacter spp.</i>) Фекалии Стерильный контейнер	600 до 48 ч.

- Задавайте вопросы врачам лаборатории
- Общайтесь с коллегами
- Узнавайте новое

Практическая польза для врачей-клиницистов
в соцсетях DuoCor.Lab



За дополнительной информацией
можно обратиться:

